

PARAMETRES AYANT UN COURT DELAI DE STABILITE

A PRELEVER A PARTIR DE 7H

- Ionogramme, Potassium : stabilité de 6 heures
(Tube hépariné avec gel (Bouchon VERT))
- TCA (dans le cadre d'un bilan pré-opératoire) et Facteur V : stabilité de 6 heures
(Tube citraté (Bouchon BLEU))

- ATTENTION : TCA (dans le cadre d'une surveillance de l'héparine) : stabilité de 6 heures sur tube CTAD mais uniquement de 2 heures sur Tube citraté.

NB : Les tubes CTAD ne sont pas dans les coffrets mais sont à votre disposition sur simple demande.

- 1) l'IDE doit entourer le coffret de prélèvement d'un **élastique rouge**
- 2) la pharmacie (ou l'IDE) doit mettre le prélèvement dans un **sac jaune** du laboratoire
«Analyse très urgente - traitement prioritaire »

EXAMENS BIOLOGIQUES SPECIALISES A CONGELER DANS 4 LES HEURES :

A PRELEVER A PARTIR DE 9H

(EXAMENS BIOLOGIQUES SPECIALISES LES PLUS FREQUENTS ENVOYES AU LABORATOIRE BIOMNIS)

Aldostérone	Tube sec (Bouchon JAUNE)	<p>Délai de 4 heures entre le prélèvement et la congélation au laboratoire</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'IDE doit entourer le coffret de prélèvement d'un élastique rouge 2) la pharmacie (ou l'IDE) doit mettre le prélèvement dans un sac jaune du laboratoire «Analyse très urgente - traitement prioritaire » <p>Cette liste est non exhaustive et donnée à titre indicatif : les conditions de conservation étant susceptibles d'être modifiées par le laboratoire spécialisé Biomnis, nous vous prions de consulter systématiquement le Manuel de Prélèvement dématérialisé du laboratoire, accessible sur internet: http://lbmboyer.manuelprelevement.fr/ login : pharma ou IDE mot de passe : laboboyer</p> <p>ou nous contacter au 02 35 66 59 88</p>
Anticoagulant circulant, Antithrombine	Tube citraté (Bouchon BLEU)	
Calcitonine	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
CBG (transcortine)	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Clozapine	Tube sec (Bouchon ROUGE)	
Chromogranine A	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Cross-laps	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Facteurs de la coagulation (sauf Facteur V)	Tube citraté (Bouchon BLEU)	
GH (hormone de croissance)	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
HCG chaîne β libre HCG dimère ($\alpha+\beta$) (Suivi cancérologie chez l'homme /ne concerne pas le test de grossesse β HCG)	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
HE4 (calcul ROMA)	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
HEPATITE B : ADN, charge virale de l'hépatite B	2 Tubes secs (Bouchon JAUNE)	
HEPATITE C : ARN, charge virale, génotypage	2 Tubes secs (Bouchon JAUNE)	
IGF1 (somatomédine)	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Inhibine B	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Lamotrigine (LAMICTAL)	Tube sec (Bouchon ROUGE)	
Peptide C	Tube sec (Bouchon JAUNE) ou tube hépariné avec gel (Bouchon VERT)	
PCT (Procalcitonine)	Tube sec (Bouchon JAUNE) ou tube hépariné avec gel (Bouchon VERT)	
Protéine C, Protéine S	Tube citraté (Bouchon BLEU)	
Rénine active	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Résistance à la protéine C activée	Tube citraté (Bouchon BLEU)	
Testostérone biodisponible ou libre	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Thyroglobuline	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
TPA (antigène tissulaire polypeptidique)	Tube sec (Bouchon JAUNE)	
Vitamine B1 ou B6	Tube EDTA (Bouchon VIOLET) à l'abri de la lumière	

EXAMENS BIOLOGIQUES SENSIBLES PRÉSENTANT DES CONDITIONS PRÉ-ANALYTIQUES TRÈS PARTICULIÈRES

(EXAMENS BIOLOGIQUES SPECIALISES LES PLUS FREQUENTS ENVOYES AU LABORATOIRE BIOMNIS)



Prélèvement au laboratoire IMPERATIF

Acide lactique	NSE
Activité anti-Xa (suivi des HBPM)	Complément total CH50
ACTH	Sérotonine
Ammoniémie	Somatostatine
Calcium ionisé	VIH: ARN ou charge virale ou génotypage
Catécholamines plasmatiques	Vitamine A Vitamine E

La liste des prélèvements à réaliser impérativement au laboratoire n'est pas exhaustive: pour des analyses moins courantes, consulter le Manuel des prélèvements dématérialisé du laboratoire, accessible sur internet: <http://lbmboyer.manuelprelevement.fr/>
login : pharma ou IDE
mot de passe : laboboyer

ou nous contacter au 02 35 66 59 88